

Comment contrôler et soigner la maladie de newcastle

Bien que les poules fournissent de la viande, des œufs, des revenus et du fumier aux agriculteurs, elles sont sujettes aux maladies. Or, la maladie de Newcastle est la plus meurtrière pour les poules.

Une fois que la maladie est arrivée, il n'y a pas de traitement et elle tue toute la population de poules. La maladie affecte le cerveau et le système respiratoire des poules et, une fois atteintes, le cou se tord et les ailes se paralysent. La maladie se transmet par les poules malades et les humains.

La gestion de la maladie

Étant donné que la maladie de Newcastle ne peut être que prévenue et non guérie, la prévention consiste à tenir les poules à l'écart et à les vacciner, l'efficacité du vaccin commençant à se faire sentir une semaine après la vaccination. Pour ce faire, il convient de suivre les instructions du fabricant sur la manière d'administrer le médicament. Lors de l'utilisation du vaccin, il convient de le conserver entre 2 et 8 degrés centigrades et, lors du transport sur terrain, il faut le garder au frais avec de la glace à l'intérieur du récipient.

De même, vérifiez les instructions sur le flacon du vaccin et pour l'utilisation du vaccin La Sota, assoiffez d'abord les poules en retirant tous les récipients d'eau et, si possible, donnez-leur de la nourriture sèche. Pour une meilleure absorption du vaccin, ajoutez une portion ou une tasse de lait écrémé en poudre dans cinq litres d'eau. Diluez le vaccin selon les instructions figurant sur le fond et ouvrez le flacon de vaccin sous l'eau.

Répartissez de l'eau thérapeutique dans différents récipients et placez-les dans les zones concernées. Tous les vaccins dilués doivent être administrés aux volailles dans les deux heures. Cependant, pour 1-2 vaccins, mettez une goutte dans l'œil de la poule et, pendant les journées chaudes, administrez-les le matin ou dans un endroit ombragé. Versez les vaccins restants dans les toilettes à fosse, lavez et nettoyez les ustensiles après la vaccination. Vacciner tous les quatre mois et toujours en prévention de la maladie.

Enfin, retirez les poules malades et gardez les autres à l'intérieur pour éviter qu'elles ne se mélangent.