

# Comment cultiver des oignons

Il est essentiel d'établir et de gérer correctement les pépinières afin de garantir une germination élevée des graines en plantules.

Après le semis, il faut 5 à 10 jours pour que les graines germent dans une pépinière. Lorsque 50 % des graines ont germé, retirez le paillis de la pépinière et arrosez. L'enlèvement du paillis à ce stade empêche la croissance des plantules dans le paillis, ce qui endommagerait les plantules lors de l'enlèvement du paillis.

## Gestion de la pépinière

Un ou deux jours après avoir enlevé le paillis, appliquez un fongicide préventif sur les plantules, puis faites des pulvérisations régulières à des intervalles donnés.

Quatre jours après l'enlèvement du paillis, appliquez un engrais foliaire de démarrage et 5 à 7 jours après l'enlèvement du paillis, appliquez un insecticide préventif.

Lorsque les plantules ont atteint l'âge de 4 semaines, remplacez l'engrais foliaire de démarrage par un engrais végétal. Cela permet aux plantules d'être fortes et de s'endurcir en vue du repiquage.

Veillez à ce que les plates-bandes soient toujours exemptes de mauvaises herbes. Il

est conseillé  
d'utiliser les mains pour éviter d'endommager le système racinaire. Veillez également à ce que le dessus de la plate-bande soit plat pour éviter l'érosion.

## **Repiquage**

Lorsque les plantules sont prêtes à être repiquées, mais qu'il n'y a pas de pluie pour faciliter le repiquage, donnez-leur moins d'éléments nutritifs pour contrôler leur croissance.

Si votre terrain est en pente, faites des billons de plantation à travers la pente pour contrôler l'érosion du sol.

Après le repiquage, surveillez attentivement les maladies fongiques et les ravageurs tels que les thrips, les pucerons et les acariens.

Si le sol est pauvre en phosphore, ajoutez du Diamonium phosphate au moment du repiquage.