

»Dalili 10 kwamba sungura wako ni mgonjwa«

.Ili kuwa mfugaji wa sungura mwenye mafanikio, ni muhimu kutofautisha kati ya sungura wa kawaida na mgonjwa. Sungura wagonjwa huonyesha ishara maalum.

Kutokula; ikiwa sungura wako hajala chakula ndani ya saa 8 hadi 10 zilizopita basi ni mgonjwa. Unaweza kujaribu kuipatia juisi ya nanasi kwani inasaidia kuondoa kizuizi endapo kuna kitu kimezuia GIT yake. Kupunguza uzito ni ishara nyingine ya ugonjwa kwa hivyo ikiwa sungura wako wanapunguza uzito haraka au mifupa inaonyesha kupita kiasi. Sababu nyingine zinazoweza kupunguza uzito ni pale sungura wanaposhambuliwa na minyoo na wanapozeeka yaani zaidi ya miezi 7.

Dalili za ugonjwa

Ikiwa sungura wako amelala chini, jaribu kuwapa utunzaji muhimu na ikiwa hii itashindwa kufanya kazi basi fikiria kumpeleka kwa daktari wa mifugo.

Vipande vya kivuli vya manyoya: Ikiwa sungura ana mabaka ambayo hayana manyoya na unaweza kuona ngozi moja kwa moja basi hii ni ishara kwamba ana chawa na unapaswa kuwadhibiti.

Kusaga meno: Hii inaonyesha kwamba sungura ana maumivu. Ikiwa wana uchafu wowote kutoka kwa mdomo, masikio na pua.

Wakati sungura anashindwa kuota. Kwa kawaida, sungura anatakiwa kutaga kila siku na kinyesi kinapaswa kuwa kikubwa, cha kahawia na kisicholowa maji. Mwife daktari wa mifugo ikiwa kuna nywele kwenye kinyesi. Kutenda tofauti na kupiga kelele. Kupiga kelele kunaonyesha kuwa sungura ana maumivu mengi.