

Gestion de la mise bas

Gestion des animaux

Tout d'abord, il faut beaucoup d'énergie pour produire du lait, il faut donc augmenter la ration alimentaire de 2 kg + 0,4 kg pour obtenir une production optimale d'aliments pour les porcelets. Augmentez la quantité d'aliments de 0,5 kg par jour et mettez la truie dans le parc de mise bas 5 jours avant la mise bas, ce qui est conçu pour assurer un climat optimal pour la truie et les porcelets. Cela permet également d'éviter l'écrasement des porcelets lorsque la truie se couche pour allaiter et d'aider à la naissance si nécessaire.

De même, la truie devrait être placée entre des poutres faisant face à des mangeoires et ne pas pouvoir se retourner, et elle devrait pouvoir rester en contact avec ses porcelets. Les porcelets et la truie doivent avoir accès à de l'eau fraîche et il faut s'assurer que la truie est propre et désinfectée avant de la placer dans le parc de mise bas.

En outre, reconnaissez le début de la mise bas lorsque le pis se remplit et que, toutes les 15 minutes, un porcelet naît, et efforcez-vous de désinfecter vos mains et votre matériel pendant la mise bas. Gardez les lumières allumées pour

minimiser le stress

pendant la mise bas, surveillez la croissance des porcelets en les pesant une fois par semaine.

Comme le fumier indique la consommation des aliments et de l'eau par la truie, une bonne mamelle est bien remplie lorsque la truie allaite en se couchant sur le côté et la production de lait est estimée en fonction du poids des porcelets et de leur comportement. Au moment du sevrage, déplacez la truie vers l'aire d'insémination et commencez à lui donner de la nourriture en abondance.

Enfin, la période de mise bas est terminée lorsque les porcelets sont sevrés.