

La gestion des pépinières du palmier à huile: 2è partie

Une bonne gestion des pépinières du palmier à huile assure une bonne croissance des plantes et génère considérablement des revenus pour l'agriculteur.

Pour un rendement maximal, assurez-vous de planter des graines de palmier propres et de bonne qualité. Assurez-vous également de séparer les déchets organiques et inorganiques dans les champs de palmiers ainsi que de pulvériser des herbicides sur le sol entre le polyéthylène conservé pour maximiser la croissance des plantules. De plus, manipulez les plantules avec soin lors du repiquage pour éviter des pertes.

Les bonnes pratiques

Toujours irriguez les palmiers quotidiennement à l'aide d'un arrosoir plat perforé pour la pré-pépinière et d'un arrosoir aérien dans la pépinière principale pour éviter la flétrissement des plantules. Maintenez également la pression d'eau requise à l'aide de manomètres et de vannes d'arrêt pendant l'irrigation pour éviter d'endommager les plants. De plus, vérifiez régulièrement les conduites d'eau et débloquez les tuyaux bouchés pour assurer un débit d'eau constant vers les cultures, puis plantez les semences.

En outre, embauchez des personnes bien formées pour appliquer les engrais à l'aide de récipients calibrés et éviter tout contact entre les semences et l'engrais. Par la suite, paillez en utilisant des coquilles des noyaux du palmier à 2,5 cm de profondeur autour de la plante pour minimiser la perte d'humidité, supprimer les mauvaises herbes, fournir des nutriments

et

prévenir l'érosion. De plus, assurez le contrôle des mauvaises herbes et des déchets pour maximiser la croissance des plantules tout en surveillant et en contrôlant constamment les ravageurs.

Après le repiquage, éliminez les plants chétifs et surveillez la croissance à partir du 4^e mois après la plantation des graines. Faites un échantillonnage aléatoire des plantes pour analyser la progression de

la croissance et à 6-7 mois après le repiquage, éliminer les arbres à faible croissance. Enfin, après 8 mois, taillez les racines dans les sacs en polyéthylène pour éviter le choc des plants et arrosez abondamment les plantules

avant le repiquage pour éviter le choc de repiquage et l'avortement des fleurs.