

La gestion efficace des mauvaises herbes dans le riz

Les mauvaises herbes sont un problème pour les agriculteurs, car elles absorbent de l'eau et des nutriments, ainsi le riz produit moins. C'est pourquoi il est important de savoir comment traiter correctement les mauvaises herbes.

Contrairement au riz, de nombreuses mauvaises herbes meurent sous l'eau. Les graines des mauvaises herbes se trouvent dans le sol et se répandent avec du vent et de l'eau de nettoyage. Certaines graines des mauvaises herbes sont mélangées à des grains du riz. Au cours des six premières semaines, les mauvaises herbes sont les plus nuisibles.

Lutte contre les mauvaises herbes

Le labourage tue les mauvaises herbes et brûle leurs graines, de sorte qu'elles ne peuvent pas germer. Si le champ est inondé pendant deux semaines, la plupart des mauvaises herbes meurent. Il faut donc labourer et inonder deux fois avant de semer.

Veillez à ce que les canaux d'irrigation et les bords des champs soient exempts de mauvaises herbes et prenez des semences de riz exemptes de mauvaises herbes. L'utilisation de

semences de qualité permet d'obtenir des plantes plus robustes et de mieux lutter contre les mauvaises herbes. Les variétés qui sont plus faciles à planter à un stade précoce sont capables de mieux supprimer les mauvaises herbes.

Si vous repiquez des plants de deux semaines, vous donnez au riz un avantage sur les mauvaises herbes. Si vous n'avez pas le temps de repiquer, vous pouvez commencer à planter des grains pré-germés. Mettez les grains de riz dans l'eau et retirez ceux qui flottent. Veillez à utiliser du riz sain, exempt de mauvaises herbes. Laissez reposer toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Laissez ensuite germer pendant deux jours.

Les mauvaises herbes poussent davantage lorsqu'il y a trop d'espace entre les plants du riz. Le riz des plaines peut être planté à une distance de 15 à 20 cm les uns des autres. Le désherbage est plus facile lorsque les plants du riz sont alignés.

Lorsque vous plantez directement, vous devez désherber après trois semaines pour la première fois. Deux à trois semaines plus tard, vous pouvez désherber une deuxième fois. Avec le riz repiqué, vous ne devez désherber qu'une seule fois lorsque les plants commencent à taller. Le stade du tallage est le meilleur

moment pour ajouter de
l'azote. Les herbicides peuvent également être utilisés, mais
ils ne sont pas
tous adaptés à la lutte contre les mauvaises herbes. Le champ
doit être propre
pour ne pas avoir à fertiliser les mauvaises herbes.