

L'élevage des chevaux au Kenya – partie 1

Il s'agit d'un engagement important en termes de soins, de finances et de temps. Les chevaux domestiques commencent typiquement leur formation à l'équitation et au port du harnais entre l'âge de deux et quatre ans.

L'alimentation

Les besoins nutritionnels des chevaux varient considérablement en fonction de leur stade de vie, ce qui rend difficile l'adoption d'une approche unique en matière d'alimentation. Les chevaux sont généralement nourris deux fois par jour, mais lorsqu'ils travaillent, ils peuvent avoir besoin de trois repas. La quantité et la composition de leur nourriture doivent être adaptées à leur taille. Les options alimentaires pour les chevaux comprennent le son de blé, le repas du cheval et l'orge broyée ou bouillie. Pour faciliter leur digestion, on peut ajouter de la salade à leurs aliments.

Il est essentiel de faire preuve de prudence lors de la mise en selle des chevaux afin d'éviter des dommages potentiels au dos. Un sellage inapproprié peut entraîner des problèmes de dos. Les chevaux souffrant de lésions dorsales peuvent encore être gardés comme

animaux de compagnie, mais ne conviennent pas à l'équitation.

Alimentation et gestion des maladies

Les besoins nutritionnels des chevaux peuvent varier considérablement en fonction de leur stade de vie, ce qui rend difficile la recherche d'une alimentation universelle. Les chevaux sont généralement nourris deux fois par jour, mais lorsqu'ils travaillent activement, ils peuvent avoir besoin de trois repas plus légers. La quantité de nourriture doit être adaptée à la taille du cheval. Les options alimentaires pour les chevaux comprennent le son de blé, le repas du cheval et l'orge broyée ou bouillie. L'ajout de salade à leur alimentation peut faciliter la digestion.

Il est essentiel de reconnaître les signes et les symptômes d'un cheval malade, en particulier d'un cheval souffrant de coliques. Les signes courants des coliques sont l'agitation, les coups de patte au sol, la transpiration, l'accélération du rythme respiratoire, les coups de pied irrités dans l'estomac, l'étirement comme pour uriner et le fait de se rouler ou d'essayer de se rouler. Pour traiter les coliques, il faut administrer de l'huile de salade et veiller à ce que le cheval ne s'allonge pas, car les intestins risquent alors de rouler et de se bloquer, ce qui est dangereux pour le cheval.

Les mesures préventives pour les
maladies des chevaux comprennent une vermifugation régulière
pour les
débarrasser des parasites internes et préserver la santé de
leur peau.