

Lutte contre les mauvaises herbes du riz

Les mauvaises herbes constituent un problème majeur pour les riziculteurs car elles rendent la préparation du difficile, absorbent l'eau et les nutriments et réduisent les rendements du riz de manière notable. Les deux principales adventices sont celles qui sont pérennes et annuelles.

Dans les zones de basses terres, la plantation devrait être espacée de 15 cm et, pour le semis direct, désherbez après 3 semaines et après 2 à 3 semaines, tandis que pour le riz repiqué, désherbez seulement au début du tallage et appliquez de l'azote pour augmenter le rendement.

Mesures de contrôle

Labourez la terre, niveler et inonder le champ de riz pour enfouir les mauvaises herbes à une profondeur telle qu'elles ne peuvent pas germer, et déracinez les mauvaises herbes qui sèchent par la suite

Inondez le champ nivelé pendant 2 semaines et gérez efficacement l'eau pour tuer les mauvaises herbes existantes.

Labourez la terre et inondez le champ une seconde fois pour tuer toutes les

mauvaises herbes qui peuvent se multiplier par les graines et les racines.

Maintenez les canaux d'irrigation et les bordures des champs propres et curez les canaux d'irrigation en premier lieu, car l'eau d'irrigation et le vent peuvent introduire des graines d'adventices.

Utilisez des semences saines, bien séchées et correctement conservées, exemptes de grains de mauvaises herbes, pour une bonne germination des grains et des plantes plus vigoureuses.

Maintenez une couche d'eau au champ pour empêcher la germination des graines de mauvaises herbes.

Drainez le sol et appliquez des engrais ou des herbicides pour une croissance plus rapide du riz et une meilleure compétitivité par rapport aux mauvaises herbes.

Semez en lignes pour distinguer facilement les mauvaises herbes du riz et les contrôler efficacement.

Utilisez un herbicide après avoir demandé l'avis d'un vendeur d'herbicides ou d'un agent de vulgarisation.