

»Matunda yanayopandwa katika Hydroponics«

Tunda limeainishwa kama hilo ikiwa linakua kutoka kwa maua. Pamoja na mimea mingine kama viazi, pilipili na mimea ya yai, nyanya ni mwanachama wa familia ya nightshade.

Nyanya zinaweza kupandwa kwa kupanda mbegu za nyanya, kuzieneza kutoka kwa vipandikizi au kununua miche. Nyanya zilizopandwa kwenye udongo zinaweza kuwa na vimelea vya magonjwa ambavyo huenea kwa urahisi katika mifumo ya haidroponi. Nyanya zimeainishwa kama aina bainifu na zisizo na kipimo ambapo chaguzi za kuamua ni nzuri kwa nafasi ndogo. Mimea isiyo na kipimo hukua kama mizabibu na inahitaji kuchujwa au kuteremka na inaweza kutoa mazao mengi zaidi. Wanakua bora chini ya urefu wa siku kati ya masaa 12–18.

Pilipili

Pilipili zinaweza kuenezwa kutoka kwa mbegu, vipandikizi, miche na hidroponics. Zote mbili zinafaa kwa utamaduni wa maji ya kina.

Miche hupandwa kwa umbali wa cm 45–60 kutoka kwa kila mmoja. Wakulima wengi wanapendekeza kutumia suluhisho la virutubishi kwa pilipili na pilipili.

Strawberries

Kwingineko, strawberries zinapendekezwa kukuzwa kwa kutumia mbinu ya filamu ya virutubishi (NFT). Unaweza kuanza matunda yako kutoka kwa mbegu, runners au miche. Kwa mazao yaliyovunwa karibu mara moja, tumia miche kutoka kwa muuzaji anayejulikana. Mifumo ya ndani inaweza kuhitaji uchavushaji wa mikono.

Hali bora kwa jordgubbar ni joto zaidi ya 18 ° C. Viwango vya

chini vya joto vya usiku hadi chini ya 10°C vinawezekana ili kuboresha ladha na utamu katika beri.

Goose berries na tikiti maji

Mavuno ya kwanza ya matunda ya goose hupatikana ndani ya miezi 5 baada ya kupanda. Kupandikiza miche mchanga kwenye mfumo wa hydroponic hufanywa baada ya kusafisha kabisa mizizi.

Kuhusu matikiti, linganisha aina ya mimea na hali ya hewa yako na angalia upinzani dhidi ya aina za ukungu wa unga. Kiwango cha juu cha potasiamu kwa ukuzaji wa tikiti kinapendekezwa kwa uzalishaji bora wa maua na kuweka matunda.