

»Uenezi wa Parachichi kwa kutumia Njia ya Frolich«

Mbegu zilizochavushwa kwa njia tofauti haziwezi kuwa sehemu ya aina ambayo ilichukuliwa lakini tunaweza kutumia njia ya pili inayojulikana kama uenezaji wa hisa za mizizi ya clonal.

Uenezaji wa kaloni hufuata njia ya Florrich ambapo mbegu hutumiwa kuanzisha nyenzo kama tu mzizi wa mche. Mche huoteshwa na kupandikizwa kwa chipukizi la mmea uliokomaa wa mzizi wa aina kama Juke 7 au Deucy. Kisha mimea huwekwa kwenye chumba chenye giza na kusababisha buds za maua kukua na kuwa shina mpya. Ondoa mmea kutoka kwenye giza mara tu machipukizi yana urefu wa 20cm na weka homoni za mizizi chini ya graft.

Uenezi wa clonal

Funika mche kwa udongo ukiacha sehemu ya juu ya chipukizi ikitoka kwenye udongo na kisha uache mmea kwenye chafu ili kukauka na kupona.

Omba pandikizi la pili kutoka kwa aina ya scion ambayo buds zitakua hadi aina ya matunda unayotaka. Kipandikizi cha kwanza kilichofunikwa na udongo kitapita mizizi iliyokuzwa kutoka kwa mbegu ya mwanzo. Njia ya clonal inachukua muda na inahitaji vifaa maalum.

Faida kuu

Faida kuu ya uenezaji wa clonal ni kwamba mkulima anajua sifa halisi za shina kwa sababu pandikizi la kwanza lilifanywa kwa kutumia nyenzo za clonal.